

"Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years" was created and translated Sept 12, 2024 by M-HEAL. [Dari]

## واکسین های توصیه شده برای اطفال از ۷ تا ۱۸ ساله

نام طفل:  
تاریخ تولد:

این سند بر اساس توصیه های مراکز کنترل و پیشگیری از امراض ایالات متحده سر از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴ می باشد.

اگر طفل شما به خارج از ایالات متحده سفر می کند، در منطقه ای زندگی می کند که عفونت های دنگی (dengue) در آن شایع است، در مورد آبله های شادی سوالات دارد یا مرضی دارد که می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند، از داکتر خود بپرسید که آیا واکسین اضافی لازم است یا خیر.

اگر طفل شما هنوز تمام واکسین های دوران طفولیت خود را دریافت نکرده است، به "واکسین های توصیه شده برای اطفال از تولد تا ۶ ساله" مراجعه کنید. داکتر شما یک پلان متفاوت ترتیب می دهد تا اطمینان حاصل کند که طفل شما تمام واکسین های خود را دریافت می کند.

سن به سال												
۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	
□ کووید-۱۹*												کووید-۱۹*
□ زوکام (هر سال)*												آنفلوانزا (زوکام)*
□ Tdap												تیتانوس، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap)
□ HPV (۲ یا ۳ دوز)**												ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)**
□ M												بیماری مننگوکوک (M)
□ اگر در جریان RSV حامله هستید												ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV)

HPV\*\*: برای اطفال ۹ تا ۱۴ ساله، ۲ دوز HPV وجود دارد. برای اطفالی که اولین دوز را در سن ۱۵ سالگی یا بالاتر دریافت می کنند، ۳ دوز HPV وجود دارد.

\*کووید-۱۹ و زوکام: یک دوز در سال برای اکثر اطفال؛ برخی از اطفال به دوزهای اضافی نیاز دارند.

معلومات اضافی: