

"Recommended Vaccines for Children from Birth to 6 Years" was created and translated Sept 12, 2024 by [M-HEAL](#). [Dari]

واکسین های توصیه شده برای اطفال از تولد تا ۶ ساله

نام طفل:
تاریخ تولد طفل:

این سند بر اساس توصیه های مراکز کنترل و پیشگیری از امراض ایالات متحده سر از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴ می باشد.

اگر طفل شما تمام واکسین های توصیه شده را به موقع دریافت نکرده باشد، داکتر پلان متفاوت را ترتیب می دهد تا اطمینان حاصل کند که واکسین را دریافت می کند. اگر طفل شما به خارج از ایالات متحده سفر می کند یا دارای یک مرض است که می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند، از داکتر خود بپرسید که آیا واکسین اضافی لازم است یا خیر. *اولین باری که طفل شما واکسین های سالانه خاصی (مانند آنفولانزا) را دریافت می کند، ممکن است به ۲ دوز نیاز داشته باشد.

| تولد | ماه ۱ | ماه ۲ | ماه ۴ | ماه ۶ | ماه ۱۲ | ماه ۱۵ | ماه ۱۸ | ماه ۱۹-۸ | سال ۲-۳ | سال ۴-۶ | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| HepB □ | HepB □ | | | | | | HepB □ | | | | هیپاتیت B (HepB) |
| | | RV □ | RV □ | RV □ | | | | | | | روتاویروس (RV) |
| | | DTaP □ | DTaP □ | DTaP □ | | | DTaP □ | | | DTaP □ | دیفتری، تیتانوس، سیاهسرفه (DTap) |
| | | | | | | Hib □ | Hib □ | Hib □ | Hib □ | | هیموفیلوس آنفولانزا (Hib) |
| | | | | | | PCV □ | PCV □ | PCV □ | PCV □ | | مریضینوموکوکی (PCV) |
| | | | | | | | | | | IPV □ | پولیو (IPV) |
| | | | | | | | | | * کووید-۱۹ (هر سال) | | کووید-۱۹* |
| | | | | | | | | | * زوکام (هر سال) | | آنفولانزا (زوکام)* |
| | | | | | | | | | MMR □ | MMR □ | سرخکان، کلهچرک، سرخجه (MMR) |
| | | | | | | | | | Var □ | Var □ | واریسلا یا آبله مرغان (Var) |
| | | | | | | | | HepA (2) □ | | | هیپاتیت A (HepA) |
| | | | | | | | | | □ ۱ دوز برای نوزادان از تولد تا ۷ ماهه بسته به وضعیت واکسین RSV مادر | | ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) |
| | | | | | | | | | □ برخی از نوزادان ۸ تا ۱۹ ماهه واجد شرایط هستند. با داکتر طفل تان ببینید. | | |