

"واکسین ها از اطفال، خانواده ها و جوامع
ما محافظت می کنند."



برای خواندن توصیه های واکسین دوران
طفلی بر بنیاد دستورالعمل مراکز کنترل
و پیشگیری از مریضی های ایالات
متحده (CDC) به زبان های دری و
پشتو، لطفاً به آدرس ذیل مراجعه کنید:
www.nrcrim.org/afghan



تصویر ساز: Lilly Taing

واکسین ها
زندگی را نجات
می دهند

سالانه از ۴ میلیون مرگ و میر در سراسر جهان با
واکسیناسیون اطفال جلوگیری میشود.



تصویر ساز: Lilly Taing

واکسین ها مصون هستند.

اطفال برای تقویت بدن خود برای مبارزه با عفونت های جدی و
جلوگیری از امراض کشنده به واکسین ضرورت دارند.

در ایالات متحده، سازمان غذا و دوا **FDA** و مراکز کنترل و
پیشگیری از مریضی **CDC** بر ذخیره سازی، کیفیت و عوارض
جانبی برای ایمنی تولید واکسین نظارت میکنند.

- برای اکثر واکسین ها، اطفال برای محافظت کامل به بیش از یک
دوز ضرورت دارند.
- عوارض جانبی خفیف واکسین - مانند تب یا درد بازو - شایع است
و میتوان آن را در خانه با استراحت یا دواهای بدون نسخه تداوی
کرد. عوارض جانبی جدی نادر است.

نام طفل: _____

تاریخ تولد: _____

تولد:

زردی بی (B)

۲ ماه:

زردی بی (B)، واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون سلول (DTaP)، پولیو، هیموفیلوس
آنفلوانزا نوع بی (Hib)، واکسین جوره بی پنوموکوک (PCV)، واکسین ویروس روتا (RV)

۴ ماه:

واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون سلول (DTaP)، پولیو، هیموفیلوس آنفلوانزا نوع بی
(Hib)، واکسین جوره بی پنوموکوک (PCV)، واکسین ویروس روتا (RV)

۶ ماه:

زردی بی (B)، واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون سلول (DTaP)، پولیو، هیموفیلوس
آنفلوانزا نوع بی (Hib)، واکسین جوره بی پنوموکوک (PCV)، واکسین ویروس روتا (RV)

۶ ماه یا بیشتر از آن

واکسین های کووید-۱۹، واکسین سالانه زوکام

۱۲-۱۵ ماه:

واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون سلول (DTaP)، هیموفیلوس آنفلوانزا نوع بی (Hib)،
واکسین جوره بی پنوموکوک (PCV)، زردی ای (A)، سرخکان، کله چرک، بثورات پوستی (MMR)،
واکسین تبخال (VAR)

۱۸ ماه:

زردی ای (A)

۴-۶ سال:

واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون سلول (DTaP)، پولیو، سرخکان، کله چرک،
بثورات پوستی (MMR)، واکسین تبخال (VAR)

۱۱-۱۲ سال:

واکسین جوره بی منگوکول (MCV)، واکسین التهاب مجرا تنفسی، تیتانوس و سیاه سرفه بدون
سلول (DTaP)، یناسنا یامولیاپ سوربو (HPV)

۱۶ سال:

واکسین جوره بی منگوکول (MCV)، ملنجیت بی (MenB)

این سند بر بنیاد توصیه های ۱۰ فبروری سال ۲۰۲۳ مراکز کنترل و پیشگیری از
مریضی های ایالات متحده میباشد. داکتر طفل شما ممکن است بر اساس سابقه صحی،
برنامه سفر یا عوامل دیگر توصیه های بیشتری داشته باشد. لطفاً در مورد واکسین های
توصیه شده قبل، در جریان و بعد از حامله داری با داکتر خود مشوره کنید.