

Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years

Child's Name:
Date of Birth:

"Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years" was created and translated Sept 12, 2024 by [M-HEAL](#). [English]

This document is based on recommendations of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention as of Sept 12, 2024.

If your child will be traveling outside the U.S., lives in a region where dengue infections are common, has questions about Mpox, or has a health condition that can weaken the immune system, ask their doctor whether any additional vaccines are needed.

If your child has not yet received all of their early childhood vaccines, see "Recommended Vaccines for Children Birth to 6 Years." Your doctor will make a different plan to ensure they get caught up on all their vaccines.

	Age in Years											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COVID-19*	☐ COVID-19 (every year)*											
Influenza (Flu)*	☐ Flu (every year)*											
Tetanus, Diptheria, and Pertussis (Tdap)					☐ Tdap							
Human papilloma virus (HPV)**			☐ HPV (2 or 3 doses)**									
Meningococcal disease (M)					☐ M					☐ M		
Respiratory syncytial virus (RSV)					☐ If pregnant during RSV season							

Additional information:

*COVID-19 and Flu: One dose every year for most children; some children will need additional doses.

**HPV: For children ages 9 through 14 years, there are 2 doses of HPV. For children who receive the first dose at age 15 or older, there are 3 doses of HPV.

Рекомендовані щеплення для дітей від 7 до 18 років

Ім'я та прізвище дитини:
Дата народження:

"Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years" was created and translated September 12, 2024 by [M-HEAL](#). [Ukrainian]

Цей документ заснований на рекомендаціях [Центрів з контролю та профілактики захворювань \(CDC\)](#) в США.

Якщо ваша дитина планує поїздку за межі США, живе в регіоні з високою поширеністю лихоманки денге або віспою мавп або має захворювання, яке може ослаблювати імунну систему, запитайте в лікаря, чи потрібні для захисту дитини додаткові вакцини.

Якщо ваша дитина ще не отримала всі щеплення, передбачені для молодшого дитячого віку, див. «Рекомендовані щеплення для дітей від народження до 6 років». Ваш лікар складе для дитини індивідуальний план вакцинації, щоб наздогнати пропущені щеплення.

	Вік у роках											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COVID-19*	☐ COVID-19 (доза щороку)*											
Грип*	☐ Грип (доза щороку)											
Кашлюк, дифтерія, правець (КДП)					☐ КДП							
Вірус папіломи людини (ВПЛ)**			☐ ВПЛ (2 або 3 дози)**									
Менінгококова інфекція (М)					☐ М					☐ М		
Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ)					☐ Якщо жінка вагітна під час сезону РСВ							

Додаткова інформація:

*COVID-19 і грип. Для більшості дітей одна доза щороку; деяким дітям можуть знадобитися додаткові дози.

**ВПЛ. Дітям від 9 до 14 років вводять 2 дози вакцини від ВПЛ. Дітям, які отримали першу дозу у віці 15 років або старше, вводять 3 дози вакцини від ВПЛ.