

# Recommended Vaccines for Children from Birth to 6 Years

"Recommended Vaccines for Children from Birth to 6 Years" was created and translated Sept 12, 2024 by [M-HEAL](#). [English]

Child's Name:  
Child's Date of Birth:

This document is based on U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommendations as of Sept 12, 2024.

If your child has not received all the recommended vaccines on time, your doctor will make a different plan to ensure they get caught up. If your child will be traveling outside the U.S. or has a health condition that can weaken the immune system, ask their doctor whether any early or additional vaccines are needed. Some brands of RV and Hib do not require a dose at age 6 months. \*The first time your child receives yearly vaccines (like Flu), they may need 2 doses.

	Birth	1 Month	2 Months	4 Months	6 Months	12 Months	15 Months	18 Months	19-23 Months	2-3 Years	4-6 Years
Hepatitis B (HepB)	<input type="checkbox"/> HepB	<input type="checkbox"/> HepB			<input type="checkbox"/> HepB						
Rotavirus (RV)			<input type="checkbox"/> RV	<input type="checkbox"/> RV	<input type="checkbox"/> RV						
Diphtheria, Pertussis, Tetanus (DTaP)			<input type="checkbox"/> DTaP	<input type="checkbox"/> DTaP	<input type="checkbox"/> DTaP		<input type="checkbox"/> DTaP				<input type="checkbox"/> DTaP
Haemophilus influenzae (Hib)			<input type="checkbox"/> Hib	<input type="checkbox"/> Hib	<input type="checkbox"/> Hib	<input type="checkbox"/> Hib					
Pneumococcal disease (PCV)			<input type="checkbox"/> PCV	<input type="checkbox"/> PCV	<input type="checkbox"/> PCV	<input type="checkbox"/> PCV					
Polio (IPV)			<input type="checkbox"/> IPV	<input type="checkbox"/> IPV	<input type="checkbox"/> IPV						<input type="checkbox"/> IPV
COVID-19*					<input type="checkbox"/> COVID-19 (every year)*						
Influenza (Flu)*					<input type="checkbox"/> Flu (every year)*						
Measles, Mumps, Rubella (MMR)						<input type="checkbox"/> MMR					<input type="checkbox"/> MMR
Varicella aka chickenpox (Var)						<input type="checkbox"/> Var					<input type="checkbox"/> Var
Hepatitis A (HepA)						<input type="checkbox"/> 2 doses of HepA					
Respiratory syncytial virus (RSV)	<input type="checkbox"/> 1 dose for infants ages 0-7 months depending on mother's RSV vaccine status						Some infants ages 8-19 months are eligible. Speak with your child's doctor.				

## Рекомендовані щеплення для дітей від народження до 6 років

Ім'я та прізвище дитини:  
Дата народження дитини:

"Recommended Vaccines for Children from Birth to 6 Years" was created and translated September 12, 2024 by [M-HEAL](#). [Ukrainian]

Цей документ заснований на рекомендаціях [Центрів з контролю та профілактики захворювань \(CDC\)](#) в США.

Якщо ваша дитина не отримала вчасно всі рекомендовані для її віку вакцини, ваш лікар складе для неї індивідуальний план вакцинації, щоб наздогнати пропущені щеплення. Якщо ваша дитина планує поїздку за межі США або має захворювання, яке може ослаблювати імунну систему, запитайте в лікаря, чи потрібні їй для захисту додаткові вакцини. \*Коли ваша дитина вперше отримує певні щорічні вакцини (наприклад, проти грипу), їй може знадобитися 2 дози.

	Народження	1 місяць	2 місяці	4 місяці	6 місяців	12 місяців	15 місяців	18 місяців	19–23 місяці	2–3 роки	4–6 років
Гепатит В	<input type="checkbox"/> Гепатит В	<input type="checkbox"/> Гепатит В			<input type="checkbox"/> Гепатит В						
Ротавірус (РВ)			<input type="checkbox"/> РВ	<input type="checkbox"/> РВ	<input type="checkbox"/> РВ						
Кашлюк, дифтерія, правець (КДП)			<input type="checkbox"/> КДП	<input type="checkbox"/> КДП	<input type="checkbox"/> КДП		<input type="checkbox"/> КДП				<input type="checkbox"/> КДП
Гемофільна інфекція (Хіб)			<input type="checkbox"/> Хіб	<input type="checkbox"/> Хіб	<input type="checkbox"/> Хіб	<input type="checkbox"/> Хіб					
Пневмококова інфекція (ПКВ)			<input type="checkbox"/> ПКВ	<input type="checkbox"/> ПКВ	<input type="checkbox"/> ПКВ	<input type="checkbox"/> ПКВ					
Поліомієліт (ІПВ)			<input type="checkbox"/> ІПВ	<input type="checkbox"/> ІПВ	<input type="checkbox"/> ІПВ						<input type="checkbox"/> ІПВ
COVID-19*					<input type="checkbox"/> COVID-19 (щороку)*						
Грип*					<input type="checkbox"/> Грип (щороку)*						
Кір, паротит, краснуха (КПК)						<input type="checkbox"/> КПК					<input type="checkbox"/> КПК
Вітряна віспа (ВВ)						<input type="checkbox"/> ВВ					<input type="checkbox"/> ВВ
Гепатит А						<input type="checkbox"/> Гепатит А (2)					
Респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ)	<input type="checkbox"/> 1 доза для немовлят віком 0-7 місяців залежно від стану вакцинації матері від РСВ.						Може робитися деяким немовлятам віком 8-19 місяців. Обговоріть це з лікарем вашої дитини.				